

Photo Bouazza



Photo Bouazza



*** OSTEO-ARTHRITE NEONATALE DU GENOU**

Ces radiographies de face et de profil montrent une augmentation de la densité des parties molles, une lacune métaphysaire fémorale inférieure, une réaction périostée de type lamellaire et l'absence d'apparition du noyau épiphysaire fémoral inférieur



* OSTEOCHONDRITE INDUITE PAR UNE SYPHILIS CONGENITALE AU STADE 3-4 visible aux extrémités supérieure et inférieure du fémur et à l'extrémité supérieure du tibia où le signe de Winberger est évident

* Collection personnelle



Photo Anis

* OSTEOCHONDRITE SYPHILITIQUE AU STADE 4
de l'extrémité inférieure du tibia et du péroné
t personnelle



OSTEO-ARTHRITE NEONATALE DU POIGNET

(Remarquer sur la radiographie du poignet l'augmentation de la densité des parties molles, une saillie radiale inférieure et une réaction périostée)



Photo Bouazza

*** OSTEO-ARTHRITE NEONATALE DE LA HANCHE**

(Remarquer sur la radiographie du bassin la lyse osseuse métaphysaire fémorale, l'absence d'apparition du noyau épiphysaire, une réaction périostée et une luxation de la tête fémorale)

* Collection personnelle